


ラジコンヘリコプターによる 農薬散布にご協力下さい

実施日/ 散布地域	1 回 目	7月21日(火)	子生・坂田・宮崎・菌部 岩神・青郷・内浦・和田 (住宅地付近等一部地域を除く)
	2 回 目	7月30日(木)	子生・坂田・宮崎・菌部 岩神・青郷・内浦・和田 (住宅地付近等一部地域を除く)
散布時間	早朝 午前5時 ~ 午後1時頃		
散布方法	ラジコンヘリコプター (一部 農業用ドローン)		
対象病害虫	いもち病・紋枯病 カメムシ類・ウンカ類	カメムシ類・ウンカ類 ツマグロヨコバイ	
散布薬剤	ノンプラスバリダントツフロアブル	エクシードフロアブル	

※例年1回目2回目ともに2日かけて実施しておりましたが、本年度は1日で散布します。

※当日の天候により順延する場合があります。裏面もご覧ください。

【 以下の点にご協力ください！ 】

散布前	<ul style="list-style-type: none"> ●自動車は車庫に入れるか、必ずカバーをかけてください。 ●散布当日に使用する野菜などは前もって収穫するか、ビニールシートで覆って農薬がかからないようにしてください。 ●井戸などの水源にはフタをしてください。
散布中	<ul style="list-style-type: none"> ●散布区域内の田んぼに入らないでください。 ●家や小屋などの窓は閉めてください。 ●田んぼ付近での自動車の駐車は控えてください。 ●干物に農薬がかからないようご注意ください。 ●養殖場、池、プール等の水はかけ流しにしてください。 ●体や自動車などに農薬がかかった場合は、すぐに水で洗い流してください。 
散布後	<ul style="list-style-type: none"> ●農薬散布後、2～3時間は水田での農作業を控えてください。 ●農薬が原因と思われる頭痛や、めまいなど異常を感じたときは、最寄の医療機関にご相談してください。

【お問合わせ先】

★高浜町航空防除協議会 (JA福井県高浜支店営農経済課) 72-1150
★高浜町役場産業振興課 72-7705

※当該事業は、「電源立地地域対策交付金」を活用しています。

散布における注意事項

◆ 天候による日程変更

- 1) 天候の回復が見込める場合
散布時間を遅らせて実施します。
- 2) 天候の回復が見込めない場合
翌日もしくは、予備日に実施します。

◆ 重複散布について

散布する薬剤は、耐雨性の高い剤を使用しておりますが、オペレーターとの申し合わせにより、降雨があった場合は降雨から30分戻っての重複散布を実施します。

◆ 薬剤の残留性について

無人ヘリで使用する、薬剤については1回目は収穫14日前まで、2・3回目は収穫7日前と使用時期が決められています。

◆ 薬剤の効果について

薬剤については、即効性となっており薬効は、1週間から10日間程度持続し、その後徐々に薄れていきます。
いもち病・紋枯れ病・カメムシ等の激発地、常発地については、圃場を随時観察していただき、個人防除を実施して下さい。
また、耕種的防除（草刈り等）の実施によりカメムシ類の密度を低下させて斑点米の発生を抑えましょう。